

МИНЗДРАВ РОССИИ

П N014244/02-100118

СОГЛАСОВАНО

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

**ИНСТРУКЦИЯ**  
по медицинскому применению лекарственного препарата

**Канефрон® Н**

наименование лекарственного препарата

таблетки, покрытые оболочкой

лекарственная форма, дозировка

«Бионорика СЕ», Германия

наименование производителя, страна

Изменение № 3

Дата внесения Изменения « \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Старая редакция	Новая редакция
Раздел отсутствует	<b>Регистрационный номер:</b> П N014244/02
<b>Торговое название препарата:</b> Канефрон® Н	<b>Торговое наименование:</b> Канефрон® Н
Раздел отсутствует	<b>Группировочное наименование:</b> Золототысячника трава + Любистока лекарственного корень + Розмарина обыкновенного листа
<b>Лекарственная форма:</b> драже	<b>Лекарственная форма:</b> таблетки, по- крытые оболочкой.

Старая редакция	Новая редакция
<b>Состав (на 1 драже):</b>	<b>Состав (на 1 таблетку):</b>
<u>Активные компоненты:</u>	<u>Активные компоненты:</u>
измельченное лекарственное растительное сырье:	измельченное лекарственное растительное сырье:
Золототысячника трава 18 мг	Золототысячника трава 18 мг
Любистока лекарственного корень 18 мг	Любистока лекарственного корень 18 мг
Розмарина листья 18 мг	Розмарина обыкновенного
<u>Вспомогательные вещества:</u>	листья 18 мг
Крахмал кукурузный 15 мг	<u>Вспомогательные вещества:</u>
Кремния диоксид коллоидный 5,5 мг	лактозы моногидрат, магния стеарат, крахмал кукурузный, повидон К 25,
Лактозы моногидрат 45,0 мг	кремния диоксид коллоидный безводный.
Повидон 9,0 мг	
<u>Оболочка:</u>	<u>Оболочка:</u> кальция карбонат, касторовое
Железа оксид красный 0,049 мг	масло, глюкоза, краситель железа оксид
Рибофлавин Е 101 0,243 мг	красный (Е 172), крахмал кукурузный,
Кальция карбонат 17,222 мг	декстрин, воск горный гликолевый,
Декстроза 0,972 мг	повидон К 30, рибофлавин, шеллак, са-
Крахмал кукурузный 2,500 мг	хароза, тальк, титана диоксид
Крахмал кукурузный модифицированный 2,140 мг	
Воск горный гликолевый 0,075 мг	
Повидон 0,103 мг	
Касторовое масло 0,025 мг	
Сахароза 57,182 мг	
Шеллак 0,615 мг	
Тальк 43,541 мг	

Старая редакция	Новая редакция
Титана диоксид 0,333 мг	
<p><b>Описание</b></p> <p>Оранжевые, круглые, двояковыпуклые драже с гладкой поверхностью.</p>	<p><b>Описание</b></p> <p>Оранжевые, круглые, двояковыпуклые таблетки, покрытые оболочкой с гладкой поверхностью.</p>
<p><b>Способ применения и дозы</b></p> <p>Внутрь, не разжевывая, запивая водой. Взрослым: по 2 драже 3 раза в день. Детям школьного возраста: по 1 драже 3 раза в день. После ослабления остроты заболевания следует продолжить лечение препаратом в течение 2 – 4 недель.</p> <p>Во время лечения препаратом рекомендуется потребление большого количества жидкости.</p>	<p><b>Способ применения и дозы</b></p> <p>Внутрь, не разжевывая, запивая водой. Взрослым: по 2 таблетки 3 раза в день. Детям школьного возраста: по 1 таблетке 3 раза в день. После ослабления остроты заболевания следует продолжить лечение препаратом в течение 2 – 4 недель.</p> <p>Во время лечения препаратом рекомендуется потребление большого количества жидкости.</p>
<p><b>Особые указания</b></p> <p>При отеках, вызванных нарушениями функции сердца или почек, потребление большого количества жидкости противопоказано.</p> <p>При нарушенной функции почек препарат не следует назначать в качестве монотерапии.</p> <p>В случае воспалительного заболевания почек необходимо обратиться к врачу за консультацией.</p>	<p><b>Особые указания</b></p> <p>При отеках, вызванных нарушениями функции сердца или почек, потребление большого количества жидкости противопоказано.</p> <p>При нарушенной функции почек препарат не следует назначать в качестве монотерапии.</p> <p>В случае воспалительного заболевания почек необходимо обратиться к врачу за консультацией.</p>

Старая редакция	Новая редакция
<p>В случае наличия крови в моче, болей при мочеиспускании или при острой задержке мочи необходимо срочно обратиться к врачу.</p> <p>Усваиваемые углеводы, содержащиеся в одном драже, составляют менее 0,04 «хлебных единиц» (ХЕ).</p>	<p>В случае наличия крови в моче, болей при мочеиспускании или при острой задержке мочи необходимо срочно обратиться к врачу.</p> <p>Усваиваемые углеводы, содержащиеся в одной таблетке, составляют менее 0,04 «хлебных единиц» (ХЕ).</p>
<p><b>Форма выпуска</b></p> <p>Драже. По 20 драже в блистер из алюминиевой фольги (нижняя часть) и поливинилхлорид/ поливинилиденхлоридной пленки (верхняя часть). По 3 или 6 блистеров вместе с инструкцией по применению помещают в складную картонную коробку.</p>	<p><b>Форма выпуска</b></p> <p>Таблетки, покрытые оболочкой. По 20 таблеток, покрытых оболочкой, помещают в блистер из алюминиевой фольги и поливинилхлорид/ поливинилиденхлоридной пленки. По 3 или 6 блистеров вместе с инструкцией по применению помещают в пачку картонную.</p>
<p><b>Условия хранения</b></p> <p>Хранить в сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 25°C. Хранить в недоступном для детей месте.</p>	<p><b>Условия хранения</b></p> <p>Хранить в оригинальной упаковке, при температуре не выше 25°C.</p> <p>Хранить в недоступном для детей месте!</p>
<p><b>Срок годности</b></p> <p>3 года.</p> <p>Не использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке.</p>	<p><b>Срок годности</b></p> <p>3 года.</p> <p>Не применять по истечении срока годности.</p>

Старая редакция	Новая редакция
Условия отпуска из аптек Без рецепта.	Условия отпуска Отпускают без рецепта.

Представитель ООО «Бионорика»



Сокур Т.В.

МИНЗДРАВ РОССИИ  
Л №014244/02-100118  
СОГЛАСОВАНО

Прошито и пронумеровано и  
скреплено печатью 2 листов  
Менеджер отдела  
регистрации лекарственных  
препаратов  
Сокор Т.В. *Сокор*  
«19» *август 2012*

